

## Corrigé du cas clinique

# #16

QUESTION N°1 - Réponses attendues :	cotation
Hyperprotéïnorachie	2
Hypoglycorachie	2
Hypercellularité à PNN (ou pléiocytose à PNN)	2
Méningite	2
Bactérienne	2
Purulente	2
Sous-total	12

QUESTION N°2 - Réponses attendues :	cotation
<i>Streptococcus pneumoniae</i> (ou pneumocoque)	4
Diplocoque	2
Gram positif	2
Brèche ostéo-durale (ouurale ou dure-mérienne)	4
D'origine traumatique	2
Sous-total	14

QUESTION N°3 - Réponses attendues :	cotation
En urgence	2
Hospitalisation	2
Correction des troubles hydroélectrolytiques	2
Après réalisation d'hémocultures	2
Antibiothérapie	4
Intraveineuse	2
Par céphalosporine de 3 <sup>e</sup> génération	4
Ceftriaxone ou céfotaxime pour une durée de 10 à 14 jours	2
Corticothérapie	4
Dexaméthasone	2
Intraveineuse	2
Immédiatement avant ou de façon concomitante à la première injection d'antibiotique	2
Surveillance	2
De l'efficacité	NC
Et de la tolérance du traitement	NC
Sous-total	32



## Corrigé du cas clinique

# #16

QUESTION N°4 - Réponses attendues :	cotation
La méningite elle-même	2
Une encéphalite associée	2
Un abcès ou empyème cérébral	2
Une thrombophlébite cérébrale	2
Un infarctus cérébral	2
Sous-total	10

QUESTION N°5 - Réponses attendues :	cotation
Benzodiazépine d'action rapide (diazépam ou clonazépam)	4
Antiépileptique d'action prolongée (phénytoïne ou phénobarbital)	4
Surveillance	NC
Clinique	1
EEG	1
Dosage des antiépileptiques	NC
Sous-total	10

QUESTION N°6 - Réponses attendues :	cotation
Oui	NC
La vaccination antipneumococcique est recommandée	4
Chez les patients ayant une brèche ostéo-durale	2
Avec l'injection d'un vaccin conjugué	2
Puis d'un vaccin polysaccharidique	2
Sous-total	10

QUESTION N°7 - Réponses attendues :	cotation
Recherche de glucose à la bandelette réactive sur la rhinorrhée	2
Fibroscope (ou endoscopie) des fosses nasales	2
Scanner du massif facial	4
IRM de la base du crâne	4
Sous-total	12

<b>NOTE MAXIMALE AU DOSSIER</b>	<b>100</b>
---------------------------------	------------

