

Corrigé du cas clinique

#7

QUESTION N°1 - Réponses attendues :	cotation
Test de Weber	2
indifférent (ou centré)	2
Test de Rinne	2
Négatif	2
Des deux côtés	2
car surdité de transmission bilatérale	2
Sous-total	12

Otite séromuqueuse, toujours responsable d'une surdité de transmission = Weber latéralisé du côté atteint, indifférent ici puisque surdité de transmission bilatérale
 Test de Rinne toujours négatif dans les surdités transmissionnelles

QUESTION N°2 - Réponses attendues :	cotation
Fibroskopie ou rhinoscopie postérieure PMZ	2
à la recherche d'une tumeur du cavum	2
Palpation des aires ganglionnaires	2
L'examen neurologique cherche une anomalie des paires crâniennes	2
Sous-total	8

Recherche d'une tumeur du cavum + bilan clinique d'extension
 L'otite séromuqueuse chez l'adulte doit toujours faire pratiquer un examen du cavum

QUESTION N°3 - Réponses attendues :	cotation
IRM cervico-faciale	2
séquence T1	2
avec injection de gadolinium	2
montre une masse	2
située dans le cavum (rhinopharynx, nasopharynx) prenant le contraste	2
avec lyse osseuse / envahissant les structures adjacentes en faveur d'une tumeur maligne du cavum	2
Sous-total	6

QUESTION N°4 - Réponses attendues :	cotation
UCNT (carcinome indifférencié du cavum) [le plus probable]	3 + 2
Autre tumeur maligne du cavum :	3
Lymphome	3
Maladie infectieuse :	NC
tuberculose	2
ou infection par le VIH	2
Sous-total	15

UCNT du cavum : le plus probable vu l'origine ethnique

Corrigé du cas clinique

#7

QUESTION N°5 - Réponses attendues :	cotation
Bilan d'extension :	NC
TDM cervico-thoracique	2
IRM (déjà faite, non cotée)	NC
scintigraphie osseuse (TEP/TDM)	2
Bilan préchimiothérapie :	NC
hémogramme	2
ionogramme sanguin, urée sanguine créatininémie	2
ECG	2
échographie cardiaque	2
Bilan avant radiothérapie :	NC
remise en état de la denture	2
+ panoramique dentaire	2
+ examen stomatologique	2
+ réalisation de gouttière fluorée	2
Sous-total	20
QUESTION N°6 - Réponses attendues :	cotation
Rassurer le patient	2
Retirer le tamponnement antérieur	NC
Faire moucher pour évacuer les caillots	2
Mise en place d'un tamponnement postérieur par une sonde à double ballonnet	2
Hospitaliser le patient PMZ	2
Vérifier la coagulation (TP, TCA, plaquettes) car patient sous chimiothérapie	2
Sous-total	10
QUESTION N°7 - Réponses attendues :	cotation
Surdité mixte :	
la courbe de conduction osseuse est abaissée,	3
mais la conduction osseuse est meilleure que la conduction aérienne,	3
l'écart moyen entre les deux courbes est de 25 dB	3
Sous-total	9
QUESTION N°8 - Réponses attendues :	cotation
Mixte car :	
part transmissionnelle due à	2
otite séromuqueuse	2
par mauvais fonctionnement de la trompe d'Eustache	2
secondaire à la radiothérapie du cavum	2
part perceptionnelle	2
par ototoxicité	2
des sels de platine	2
Sous-total	14